

L'INNOVATION POUR LA GESTION DU CONFORT ARTICULAIRE ET DE LA MOBILITÉ DES CHEVAUX

COMMENT COSEQUIN® EQUIN ASU+HA AGIT-IL ?

Le Cosequin® Equin ASU+HA contient une combinaison innovante et exclusive d'ingrédients.



Prescriptions
vétérinaires USA

ASU

Fraction insaponifiable d'avocat/soja qui inhibe les médiateurs pro-inflammatoires des tissus de l'articulation.

Sulfate de chondroïtine

Augmente la synthèse des composants de la matrice du cartilage et inhibe l'action des enzymes qui détériorent le cartilage. Cosequin® Equin ASU+HA est le seul produit du marché contenant du sulfate de chondroïtine sous une forme aussi pure et absorbable.

Méthyl-sulfonyl méthane (MSM)

Est une combinaison organique dont le principal composant, le soufre, est nécessaire à la formation des éléments constitutifs du cartilage.

L'acide hyaluronique

Est un composant du liquide synovial et de la matrice extracellulaire du cartilage. Il aide à protéger les articulations en augmentant la viscosité du liquide synovial et en rendant le cartilage plus élastique.

La glucosamine -HCLA

Est un élément constitutif du cartilage et fournit une substance essentielle pour maintenir les cellules du cartilage en bonne santé et garantir son parfait fonctionnement. pure et absorbable.

Les polyphénols de thé vert

Dont l'épigallocatechine-3-gallate (EGCG), qui sont des antioxydants puissants.

PREUVES & ÉTUDES SCIENTIFIQUES




Par exemple l'association d'acide hyaluronique (HA), ASU, de chondroïtine sulfate et de glucosamine diminue de façon significative la production de PGE₂ par des chondrocytes équins stimulés par de l'IL-1 β ; l'effet est meilleur qu'en utilisant HA ou ASU/Glu/CS séparément. La diminution de production de PGE₂ est liée à une inhibition de l'activation de NF κ B, un médiateur qui aide au déclenchement de la réponse inflammatoire.

Heinecke et al 2010. Inhibition of prostaglandin E₂ production by hyaluronan & the combination avocado/soybean unsaponifiables, glucosamine and chondroitin sulfate in activated equine chondrocytes. ACVS Symposium Proceedings 2010.

⁽¹⁾Disponibles sur demande.

Des études scientifiques et cliniques ont démontrées que le Cosequin® Equin ASU+HA, grâce à sa composition spécifique, peut soutenir efficacement les fonctions articulaires (reconstitution du cartilage) articulaire et inhibition de médiateurs inflammatoires et d'enzymes destructrices du cartilage. Rappelons que les résultats d'études scientifiques se basent exclusivement sur l'administration du Cosequin® et qu'ils ne sont donc pas applicables à d'autres produits similaires.



L'association d'acide hyaluronique (HA), d'ASU et de sulfate de chondroïtine et (CS) inhibe la production de PGE₂ par des chondrocytes équins (CA=contrôles non activés).

MODE D'EMPLOI

Cosequin® Equin ASU+HA peut être administré tel quel par voie orale ou mélangé à la nourriture. La période d'administration initiale est normalement de 4 – 6 semaines. Après le programme initial et qu'une réponse soit observée, la dose journalière peut être réduite d'une cuillère doseuse (3,3 g) par semaine jusqu'à l'atteinte de la dose recommandée comme programme d'entretien.

POIDS DU CHEVAL	PROGRAMME INITIAL	PROGRAMME D'ENTRETIEN
< 250 KG	2 cuillères doseuses le matin + 2 cuillères doseuses le soir	2 cuillères doseuses par jour
250-500 KG	3 cuillères doseuses le matin + 3 cuillères doseuses le soir	3 cuillères doseuses par jour
> 500 KG	4 cuillères doseuses le matin + 4 cuillères doseuses le soir	4 cuillères doseuses par jour



COMPOSITION

Glucosamine HCL, méthylsulfonylméthane (MSM), sulfate de chondroïtine, insaponifiables d'avocat / soja (ASU) en poudre NMX1000®
(insaponifiables d'avocat / soja, isolats de protéines de soja), lécithines brutes, acide hyaluronique, thé.
Le contenu de chaque seau correspond à environ 212 cuillères doseuses.
Chaque cuillère doseuse remplie à ras (3,3 g) contient :

	Quantité (% en poids)
Glucosamine HCL (pureté>99%)	1420 mg (43%)
Méthylsulfonylméthane (MSM)	940 mg (28.5%)
Sulfate de chondroïtine (pureté100 %)	200 mg (6.1%)
Insaponifiables d'avocat /soja (ASU) en poudre	180 mg (5.5%)
Acide hyaluronique (hyaluronate de sodium, Hyal-Joint® DS)	20 mg (0.6%)

* Standardisé pour contenir un minimum de 30% insaponifiables d'avocat / soja (ASU) Cosequin® Equine ASU+HA contains FCHG49®, TRH122®, and NMX1000®, Nutramax Laboratories, Inc.'s proprietary veterinary researched specifications.